

Bei der Erhebung der Blutungsanamnese sollte ein standardisierter Fragebogen verwendet werden, beispielsweise der **quantitative Bleeding Score**, modifiziert nach Tosetto A et al.: A quantitative analysis of bleeding symptoms in type 1 von Willebrand disease. Results from a European study (MCMDM-1 VWD), J Thromb Haemost 2006; 4: 766-73.

Score						
Symptom	-1	0	1	2	3	4
Epistaxis	---	nein oder banal < 5 mal im Jahr	> 5 mal im Jahr oder > 10 min	Vorstellung beim Arzt, z.B. HNO keine Therapie	Tamponade oder Verödung oder Antifibrinolyse	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin
Haut: Hämatome bzw. Petechien	---	nein oder banal < 1 cm	kein Trauma und > 1 cm	Vorstellung beim Arzt keine Therapie		
Blutung bei kleinen Wunden	---	nein oder banal < 5 mal im Jahr	> 5 mal im Jahr oder > 5 min	Vorstellung beim Arzt keine Therapie	chirurgische Wund- versorgung	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin
Zahnfleisch- blutung oder andere Schleimhaut- blutungen in der Mundhöhle	---	nein	mindestens schon einmal	Vorstellung beim Arzt keine Therapie	(zahn)chirur- gische Wund- versorgung oder Antifibrinolyse	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin
Zahn- extraktionen	keine Blutung bei mindestens 2 Extraktionen	noch nie extrahiert oder keine Blutung bei 1 Extraktion	in < 25% aller Extraktionen geblutet	in > 25% aller Extraktionen geblutet keine Intervention	Revisionsnaht oder Tamponade	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin
Operation	keine Blutung bei mindestens 2 Eingriffen	noch nie operiert oder keine Blutung bei 1 Eingriff	in < 25% aller Operationen geblutet	in > 25% aller Operationen geblutet keine Intervention	chirurgische Blutstillung oder Antifibrinolyse	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin
Muskel- hämatom	---	nie	nach Trauma keine Therapie	spontan keine Therapie	spontan oder traumatisch Faktorengabe oder Desmopressin	spontan oder traumatisch chirurgische Blutstillung oder EK-Gabe

Score						
Symptom	-1	0	1	2	3	4
Hämarthros	---	nie	nach Trauma keine Therapie	spontan keine Therapie	spontan oder traumatisch Faktorengabe oder Desmopressin	spontan oder traumatisch chirurgische Blutstillung oder EK-Gabe
gastro- intestinale Blutung	---	nie	assoziiert mit Ulcera oder portalem Hochdruck oder Hämorrhoiden oder Angio- dysplasien	spontan	chirurgische Intervention Faktorengabe oder Desmopressin oder EK-Gabe oder Antifibrinolyse	
zentrale Blutung	---	nie			subdural und Intervention	intrazerebral und Intervention
Bei Frauen						
Hyper- menorrhoe bzw. Menorrhagie	---	nein	Vorstellung beim Gynäkologen keine Therapie	Pille Anti- fibrinolytika	Dilatation und Kürettage Eisen- substitution	EK-Gabe Desmopressin oder Faktorengabe Antifibrinolyse Hysterektomie
postpartale Blutung	keine Blutung bei mindestens 2 Geburten	noch nie entbunden oder keine Blutung bei 1 Geburt	Vorstellung beim Gynäkologen keine Therapie	Dilatation und Kürettage Eisen- substitution Anti- fibrinolytika	EK-Gabe Plasma- Faktorengabe oder Desmopressin	Hysterektomie

Punkte: \_\_\_\_\_

**Score  $\geq$  5 Punkte: Klinischer Verdacht auf eine Blutungsneigung**